

با واکسین‌های منظم به رشد طفل تان کمک کنید.

اطمینان حاصل کنید، که طفل تان همه واکسین‌ها را در زمان توصیه شده دریافت می‌کند این یکی از مهمترین راه‌ها برای تضمین سلامتی طفل تان هست.

واکسین‌ها در طول عمر

جدول زمانی زیر را که توسط آکادمی طبی اطفال آمریکا و سی دی سی توصیه شده است، تعقیب کنید.

برای نوزادان ۱۸-۶ ماهه

واکسین پولیو #۳ ، واکسین سینه بغل #۳، واکسین هپاتیت (ب) #۳ و آنفلونزا (سال به سال تجویز گردد)



نوزاد

واکسین هپاتیت (ب) #۱



برای نوزادان ۱۵-۱۲ ماهه

واکسین سه‌گانه (سرخکان، کله چرک و سرخچه) #۱ واکسین انفلونزا نوع اچ ای بی #۴ واکسین سینه بغل #۴ واکسین آبله مرغان #۱



برای نوزادان ۱-۲ ماهه

واکسین (دیفتری، کزار و سیاه سرفه) #۱، واکسین واکسین روتا ویروس #۱، واکسین آنفلوانزا Hib (ب) واکسین سینه بغل #۱



برای نوزادان ۲۳-۱۲ ماهه

واکسین هپاتیت (آ). #۲ و واکسین هپاتیت (آ). #۲



۴ ماهه

واکسین (دیفتری، کزار و سیاه سرفه) #۲، واکسین روتا ویروس #۲ واکسین پولیو #۲ واکسین انفلونزا نوع اچ ای بی #۲ واکسین سینه بغل #۲



برای نوزادان ۱۸-۱۵ ماهه

واکسین (دیفتری، کزار و سیاه سرفه) #۴



۶ ماهه

واکسین (دیفتری، کزار و سیاه سرفه) #۳، واکسین انفلونزا نوع اچ ای بی #۳ و اکسن روتا ویروس #۳ واکسین سینه بغل #۳



برای اطفال ۴-۶ ساله

واکسین (دیفتری، کزار و سیاه سرفه) #۵، واکسین پولیو #۵ واکسین سه‌گانه (سرخکان، کله چرک و سرخچه) #۲، واکسین آبله مرغان #۲ و واکسین تقویتی کووید (در سن ۵ سالگی)



۶ ماهه+

واکسین کووید ۱۹ تعداد دوزهای توصیه شده بستگی به سن طفل شما و نوع واکسین COVID-19 استفاده شده دارد.



برای اطلاعات جدیدتر، جدول واکسیناسیون مرکز کنترل و پیشگیری از امراض (CDC) را مشاهده کنید.



IMMUNIZE
KANSAS
COALITION

درمورد هر کدام از واکسین‌ها بیشتر بدانید!

کاری که هر واکسین انجام می‌دهد

واکسین‌های هیپاتیت بی، هیپاتیت آ:

از طفل شما در برابر ویروس هیپاتیت B و ویروس هیپاتیت A که باعث آسیب به کبد می‌شود، محافظت می‌کند.

سه دوز واکسین (هیپاتیت بی):

در دوران تولد، برای اطفال ۲-۱ ماهه (۱#) و برای اطفال ۶-۱۸ ماهه (۴#) دو دوز بعد از تجویز واکسین هیپاتیت بی

دو دوز از واکسین (هیپاتیت آ):

برای نوزادان ۱۲-۲۳ ماهه (۲#) دوز، با فاصله ۶ ماه از هم تجویز گردد.

واکسین روتاویروس:

طفل شما را از اسهال شدید و کم آبی محافظت می‌کند.

دو دوز: در ۲ ماهگی یا ۴ ماهگی یا

سه دوز: در ۲ ماهگی، ۴ ماهگی، و ۶ ماهگی

واکسین انفلونزا نوع اج ای بی:

طفل شما را در برابر انفلونزای هیموفولیس نوع B که باعث عفونت و آسیب مغزی می‌شود، محافظت می‌کند.

چهار دوز: در ۲ ماهگی، ۴ ماهگی، ۶ ماهگی و ۱۲-۱۵ ماهگی

(واکسین دیفتتری، کزان و سیاه سرفه):

در برابر دیفتتری (تورم قلب، نارسایی قلبی)، سیاه سرفه (سیاه سرفه) و کزان (باعث اسپاسم‌های دردناک عضلانی شده که منجر به قفل شدن فک می‌شود) محافظت می‌کند.

۵ دوز: در ۲ ماهگی، ۴ ماهگی، ۶ ماهگی، ۱۵-۱۸ ماهگی و ۴-۶ سالگی

واکسین پولیو:

از طفل شما در برابر بیماری فلچ اطفال که می‌تواند دستها و پاها را فلچ کند، محافظت می‌کند.

چهار دوز: در ۲ ماهگی، ۴ ماهگی، ۶ ماهگی و ۱۵-۱۲ ماهگی

واکسین سه گانه (سرخکان، کله چرک و سرخچه):

از سرخکان، کله چرک و سرخچه محافظت می‌کند (سرخچه «سرخکان آلمانی» است، شکل جدی‌تری از سرخکان است که می‌تواند منجر به نقایص مادرزادی در نوزادان شود)

دو دوز: در ۱۲-۱۵ ماهگی و ۴-۶ سالگی

واکسن آبله مرغان (وارسیلا):

طفل شما را از ابتلا به آبله مرغان محافظت می‌کند.

دو دوز: در ۱۲-۱۸ و ۴-۶ سال

واکسین سینه بغل:

در برابر پنوموکوک (که می‌تواند منجر به ذات الريه، عفونت خون و مننژیت شود)، محافظت می‌کند

چهار دوز: در ۲ ماهگی، ۴ ماهگی، ۶ ماهگی و ۱۲-۱۵ ماهگی

واکسین آنفولانزا (آنفولانزا):

از ویروس آنفولانزا محافظت می‌کند

دو دوز: برای نوزادان ۶-۱۸ ماه (دوز دوم ۲۸ روز پس از تزریق اول)، سپس تا زمان جوانی هر سال تجویز گردد.

واکسین کووید-۱۹:

واکسن‌های کووید-۱۹ به بدن ما کمک می‌کنند تا

در برابر ویروسی که باعث کووید-۱۹ می‌شود، بدون اینکه ما بیمار شویم، مخصوصیت ایجاد کند.

واکسیناسیون کووید-۱۹

برای همه افراد که عمر شان ۶ ماه و بالاتر از آن است، توصیه می‌شود. تعداد دوزهای توصیه شده بستگی به سن طفل شما و نوع واکسین کووید-۱۹ استفاده شده دارد.



IMMUNIZE
KANSAS
COALITION

Language: Dari

Version: 1/5/24

توصیه‌ها ممکن است با گذر زمان تغییر کنند و ممکن است برای هر طفل متفاوت باشند. با یک ارائه دهنده خدمات صحی در مورد واکسن‌هایی که طفل شما نیاز دارد، صحبت کنید.