

مساعدة طفلك على النمو بواسطة التطعيم المنتظم

حصول طفلك على جميع التطعيمات في الوقت الموصى به هو واحد من أهم الطرق للحفاظ على صحة طفلك.

التطعيمات حسب الأعمار

اتبع الجدول الموصى به من قبل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ومركز السيطرة على الأمراض

٦ اشهر

كوفيد-١٩

يوصى بالتطعيم ضد مرض كوفيد-19 للجميع الذين يصل عمرهم إلى ستة أشهر فما فوقها. يرتبط عدد الجرعات الموصى بها على عمر طفلك ونوع لقاح كوفيد-19 المستخدم.



مولود جديد

التهاب الكبد ب رقم ١



في شهر الى شهرين

التهاب الكبد ب رقم ٢



٦-١٨ شهرا

لقاح شلل الأطفال المعطل
٣، التهاب الكبد ب رقم ٣،
والأنفلونزا (سنوياً)



الشهران

الدفتريريا و التيتانوس و

السعال الديكي رقم ١،

فيروس الروتا رقم ١، لقاح

شلل الأطفال المعطل رقم

١، لقاح المستدمية النزلية

من النوع ب رقم ١، لقاح

المكورات الرئوية المقترن

رقم



١٢-١٥ شهرا

الحصبة، النكاف و الحصبة
المائية رقم ١، لقاح المستدمية
النزلية من النوع ب رقم ٤، لقاح
المكورات الرئوية المقترن رقم
٤، تطعيم فاعل ضد جدري
الماء (الحُمَاق) رقم ١



٤ اشهر

الدفتريريا و التيتانوس و السعال

الديكي رقم ٢، فيروس الروتا رقم

٢، لقاح شلل الأطفال المعطل

رقم ٢، لقاح المستدمية النزلية

من النوع ب رقم ٢، لقاح

المكورات الرئوية المقترن رقم ٢



١٢-٢٣ شهرا

التهاب الكبد أ رقم ١،
التهاب الكبد أ رقم ١



١٥-١٨ شهرا

ديتاب رقم ٤



٤-٦ سنوات

الدفتريريا و التيتانوس و السعال
الديكي رقم ٥، لقاح شلل
الأطفال المعطل رقم ٤،
الحصبة، النكاف و الحصبة
المائية رقم ٢، تطعيم فاعل ضد
جدري الماء (الحُمَاق) رقم ٢



٦ اشهر

الدفتريريا و التيتانوس و السعال

الديكي رقم ٣، فيروس الروتا

رقم ٣، لقاح المستدمية النزلية

من النوع ب رقم ٣، لقاح

المكورات الرئوية المقترن رقم ٣



للحصول على أحدث
المعلومات، انظري الى
جدول التطعيم الخاص
بمركز السيطرة على
الأمراض (CDC).



التهاب الكبد ب (HepB)، والتهاب الكبد أ (HepA) A

يحمي طفلك من فيروس التهاب الكبد B وفيروس التهاب الكبد A الذي يسبب تلف الكبد

ثلاث جرعات (التهاب الكبد ب) (Hep B): عند الولادة، من شهر إلى شهرين (بعد لقاح التهاب الكبد B رقم 1) ومن ٦ إلى ١٨ شهرًا (بعد ٤ أشهر من لقاح التهاب الكبد B رقم ٢)
جرعتان (التهاب الكبد أ): (HepA): ١٢-٢٣ شهرًا (جرعتان، بفارق ٦ أشهر)

فيروس الروتا (RV): يحمي طفلك من الإسهال الشديد والجفاف
جرعتان: في شهرين أو ٤ أشهر،
ثلاث جرعات: في شهرين، ٤ أشهر و٦ أشهر

لقاح المستدمية النزلية من النوع ب: يحمي من المستدمية النزلية من النوع ب التي تسبب التهابات الدماغ وتلفه
أربع جرعات: في عمر شهرين، ٤ أشهر، ٦ أشهر و١٢-١٥ شهرًا

لقاح DTaP (الدفتيريا و التيتانوس و السعال الديكي):
يحمي من الخناق (تورم القلب، وقصور القلب)، والسعال الديكي (السعال الديكي)، والكزاز (يسبب تشنجات عضلية مؤلمة تؤدي إلى قفل الفك)
خمس جرعات: عند شهرين، ٤ أشهر، ٦ أشهر، ١٥-١٨ شهرًا و٤-٦ سنوات

لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV): يحمي طفلك من مرض شلل الأطفال، وهو مرض يمكن أن يصيب الذراعين والساقين بالشلل
أربع جرعات: في شهرين أو ٤ أشهر، من ٦ إلى ١٨ شهرًا و في عمر ٤ إلى ٦ سنوات

الحصبة، النكاف و الحصبة الألمانية: يحمي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ("الحصبة الألمانية"، وهي من النوع الأكثر خطورة من الحصبة التي يمكن أن تؤدي إلى عيوب خلقية عند الأطفال)
جرعتان: في ١٢-١٥ شهرًا وفي عمر ٤-٦ سنوات

تطعيم فاعل ضد جدري المائي/الحماق (VAR): يحمي طفلك من الإصابة بالجدري المائي
جرعتان: في ١٢-١٨ شهرًا وفي عمر ٤-٦ سنوات

لقاح المكورات الرئوية المقترن (PCV): يحمي من المكورات الرئوية (يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب الرئوي، عدوى الدم، والتهاب السحايا)
أربع جرعات: في عمر شهرين، ٤ أشهر، ٦ أشهر و١٢-١٥ شهرًا

الأنفلونزا (زكام): يحمي من فيروس الأنفلونزا
جرعتان: من ٦ إلى ١٨ شهرًا (الجرعة الثانية بعد ٢٨ يومًا من الجرعة الأولى)، ثم سنويًا حتى مرحلة البلوغ

كوفيد-١٩: تساعد لقاحات كوفيد-١٩ أجسامنا على تطوير مناعة ضد الفيروس الذي يسبب كوفيد-١٩ دون أن نمرض



IMMUNIZE
KANSAS
COALITION

قد تتغير التوصيات بمرور الوقت ويمكن أن تختلف حسب الطفل. تحدث مع مقدم الرعاية الصحية حول اللقاحات التي يحتاجها طفلك.