

مساعدة طفلك على النمو بواسطة التطعيم المنتظم

حصول طفلك على جميع التطعيمات في الوقت الموصى به هو واحد من أهم الطرق للحفاظ على صحة طفلك.

التطعيمات حسب الأعمار

اتبع الجدول الزمني الموصى به أدناه من قبل الأكاديمية الأمريكية للأطفال ومركز مكافحة الأمراض

١٨-٦ أشهر

الدفتيريا و التيتانوس و السعال الديكي رقم ٢، فيروس الروتا رقم ٢، لقاح شلل الأطفال المعطل رقم ٢، لقاح المستدمية النزلية من النوع ب رقم ٢، لقاح المكورات الرئوية المقترن رقم ٢، كوفيد-١٩ والأنفلونزا (سنوياً)



مولود جديد

التهاب الكبد ب رقم ١



في شهر الى شهرين

التهاب الكبد ب رقم ٢



الشهران

الدفتيريا و التيتانوس و السعال الديكي رقم ١، فيروس الروتا رقم ١، لقاح شلل الأطفال المعطل رقم ١، لقاح المستدمية النزلية من النوع ب رقم ١، لقاح المكورات الرئوية المقترن رقم ١



١٢-١٥ شهرا

الحصبة، النكاف و الحصبة المائية رقم ١، لقاح المستدمية النزلية من النوع ب رقم ٤، لقاح المكورات الرئوية المقترن رقم ٤، تطعيم فاعل ضد جذري الماء (الحُمَاق) رقم ١



١٢-٢٣ شهرا

التهاب الكبد أ



٤ اشهر

الدفتيريا و التيتانوس و السعال الديكي رقم ٢، فيروس الروتا رقم ٢، لقاح شلل الأطفال المعطل رقم ٢، لقاح المستدمية النزلية من النوع ب رقم ٢، لقاح المكورات الرئوية المقترن رقم ٢



١٥-١٨ شهرا

ديتاب رقم ٤



٤-٦ سنوات

الدفتيريا و التيتانوس و السعال الديكي رقم ٥، لقاح شلل الأطفال المعطل رقم ٤، الحصبة، النكاف و الحصبة المائية رقم ٢، تطعيم فاعل ضد جذري الماء (الحُمَاق) رقم ٢، كوفيد-١٩ التنشيطية (في عمر خمسة سنوات)



٦ اشهر

الدفتيريا و التيتانوس و السعال الديكي رقم ٣، فيروس الروتا رقم ٣، لقاح المستدمية النزلية من النوع ب رقم ٣، لقاح المكورات الرئوية المقترن رقم ٣



اطلع على جدول
التطعيمات الخاص
بمركز مكافحة الأمراض
(CDC)



ماذا يفعل كل تطعيم؟

التهاب الكبد ب (HepB)، والتهاب الكبد أ (HepA) A

يحمي طفلك من فيروس التهاب الكبد B وفيروس التهاب الكبد A الذي يسبب تلف الكبد
ثلاث جرعات (التهاب الكبد ب) (Hep B): عند الولادة، من شهر إلى شهرين (بعد لقاح التهاب الكبد B رقم 1) ومن ٦ إلى ١٨ شهرًا (بعد ٤ أشهر من لقاح التهاب الكبد B رقم ٢)
جرعتان (التهاب الكبد أ): (HepA): ١٢-٢٣ شهراً (جرعتان، بفارق ٦ أشهر)

فيروس الروتا (RV): يحمي طفلك من الإسهال الشديد والجفاف
جرعتان: في شهرين أو ٤ أشهر،
ثلاث جرعات: في شهرين، ٤ أشهر و٦ أشهر

لقاح المستدمية النزلية من النوع ب: يحمي من المستدمية النزلية من النوع ب التي تسبب التهابات الدماغ وتلفه
أربع جرعات: في عمر شهرين، ٤ أشهر، ٦ أشهر و١٢-١٥ شهرًا

لقاح DTaP (الدفتيريا و التيتانوس و السعال الديكي):
يحمي من الخناق (تورم القلب، وقصور القلب)، والسعال الديكي (السعال الديكي)، والكزاز (يسبب تشنجات عضلية مؤلمة تؤدي إلى قفل الفك)
خمس جرعات: عند شهرين، ٤ أشهر، ٦ أشهر، ١٥-١٨ شهرًا و٤-٦ سنوات

لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV): يحمي طفلك من مرض شلل الأطفال، وهو مرض يمكن أن يصيب الذراعين والساقين بالشلل
أربع جرعات: في شهرين أو ٤ أشهر، من ٦ إلى ١٨ شهرًا و في عمر ٤ إلى ٦ سنوات

الحصبة، النكاف و الحصبة الألمانية: يحمي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ("الحصبة الألمانية"، وهي من النوع الأكثر خطورة من الحصبة التي يمكن أن تؤدي إلى عيوب خلقية عند الأطفال)
جرعتان: في ١٢-١٥ شهرًا وفي عمر ٤-٦ سنوات

تطعيم فاعل ضد جدري الماء/الحمق (VAR): يحمي طفلك من الإصابة بالجدري الماء
جرعتان: في ١٢-١٨ شهرًا وفي عمر ٤-٦ سنوات

لقاح المكورات الرئوية المقترن (PCV): يحمي من المكورات الرئوية (يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب الرئوي، عدوى الدم، والتهاب السحايا)
أربع جرعات: في عمر شهرين، ٤ أشهر، ٦ أشهر و١٢-١٥ شهرًا

الأنفلونزا (زكام): يحمي من فيروس الأنفلونزا
جرعتان: من ٦ إلى ١٨ شهرًا (الجرعة الثانية بعد ٢٨ يومًا من الجرعة الأولى)، ثم سنويًا حتى مرحلة البلوغ

كوفيد-١٩: تساعد لقاحات كوفيد-١٩ أجسامنا على تطوير مناعة ضد الفيروس الذي يسبب كوفيد-١٩ دون أن نمرض



IMMUNIZE
KANSAS
COALITION

Language: Arabic

إذا كانت لديك أسئلة، تحدث مع مقدم الرعاية الصحية حول التطعيمات التي يحتاجها طفلك.