

# با واکسین‌های منظم به رشد طفل‌تان کمک کنید.

اطمینان حاصل کنید، که طفل‌تان همه واکسین‌ها را در  
زمان توصیه شده دریافت می‌کند این یکی از مهمترین راه  
ها برای تضمین سلامتی طفل‌تان هست.

## واکسین‌ها در طول عمر

جدول زمانی زیر را که توسط آکادمی علوم صحت اطفال آمریکا  
CDC توصیه شده است، دنبال کنید.

### برای نوزادان ۶-۱۸ ماهه

واکسین (دیفتری، کزاز و سیاه  
سرفه) #۲، و اکسن روتا  
و وروس #۲ واکسین پولیو #۲  
واکسین آنفلونزا نوع اچ ای بی  
#۲ واکسین سینه بغل #۲  
واکسین کووید ۱۹ و آنفلونزا  
سال به سال تجویز گردد)



### نوزاد

واکسین هپاتیت (بی) #۱



### برای نوزادان ۱-۲ ماهه

واکسین هپاتیت (بی) #۲



### ۲ ماهه

واکسین (دیفتری، کزاز و سیاه  
سرفه) #۱، واکسین  
واکسین روتا و وروس #۱،  
واکسین آنفلونزا نوع Hib (ب)  
، واکسین سینه بغل #۱



### ۴ ماهه

واکسین (دیفتری، کزاز و  
سیاه سرفه) #۲، واکسین  
روتا و وروس #۲ واکسین  
پولیو #۲ واکسین آنفلونزا  
نوع اچ ای بی #۲ واکسین  
سینه بغل #۲



### برای نوزادان ۱۲-۲۳ ماهه

واکسین هپاتیت (آ).



### برای نوزادان ۱۵-۱۸ ماهه

واکسین (دیفتری، کزاز و سیاه  
سرفه) #۴



### برای اطفال ۴-۶ ساله

واکسین (دیفتری، کزاز و سیاه  
سرفه) #۵، واکسین پولیو #۴  
واکسین سه گانه (سرخکان، کله  
چرک و سرخچه) #۲، واکسین  
آبله مرغان #۲ و واکسین تقویتی  
کووید (در سن ۵ سالگی)



### ۶ ماهه

واکسین (دیفتری، کزاز و  
سیاه سرفه) #۳، واکسین  
آنفلونزا نوع اچ ای بی #۳ و  
اکسن روتا و وروس #۳  
واکسین سینه بغل #۳



جدول زمانی  
واکسیناسیون (CDC)  
را مشاهده کنید.



IMMUNIZE  
KANSAS  
COALITION

درمورد هر کدام از  
واکسین‌ها بیشتر بدانید!

# کاری که هر واکسین انجام می‌دهد

## واکسین‌های هیپاتیت بی، هیپاتیت آ:

از طفل شما در برابر ویروس هیپاتیت B و ویروس هیپاتیت A که باعث آسیب به کبد می‌شود، محافظت می‌کند.

### سه دوز واکسین (هیپاتیت بی):

در دوران تولد، برای اطفال ۱-۲ ماهه (۱-۲ ماه بعد از تجویز واکسین هیپاتیت بی #۱) و برای اطفال ۶-۱۸ ماهه (۴ ماه بعد از تجویز هیپاتیت بی #۲)

### دو دوز از واکسین (هیپاتیت آ):

برای نوزادان ۱۲-۲۳ ماهه (۲ دوز، با فاصله ۶ ماه از هم تجویز گردد)

## واکسین روتاویروس : طفل شما را از اسهال شدید و کم آبی

محافظت می‌کند.

**دو دوز :** در ۲ ماهگی یا ۴ ماهگی یا

**سه دوز:** در ۲ ماهگی، ۴ ماهگی، و ۶ ماهگی

## واکسین آنفلونزا نوع ای بی : طفل شما را در برابر آنفلونزای

هیموفولیس نوع ب که باعث عفونت و آسیب مغزی می‌شود، محافظت می‌کند.

**چهار دوز:** در ۲ ماهگی، ۴ ماهگی، ۶ ماهگی و ۱۲-۱۵ ماهگی

## ( واکسین ( دیفتی، کزاز و سیاه سرفه):

در برابر دیفتی (تورم قلب، نارسایی قلبی)، سیاه سرفه (سیاه سرفه) و کزاز (باعث اسپاسم‌های دردناک عضلانی شده که منجر به قفل شدن فک می‌شود) محافظت می‌کند.

**۵ دوز:** در ۲ ماهگی، ۴ ماهگی، ۶ ماهگی، ۱۸-۱۵ ماهگی و ۴-۶ سالگی

## واکسین پولیو: از طفل شما در برابر بیماری فلج اطفال که می‌تواند

دست‌ها و پاها را فلج کند، محافظت می‌کند.

**چهار دوز:** در ۲ ماهگی، ۴ ماهگی، ۶ ماهگی و ۱۲-۱۵ ماهگی

## واکسین سه گانه (سرخکان، کله چرک و سرخچه) :

از سرخکان، کله چرک و سرخچه محافظت می‌کند (سرخچه «سرخکان آلمانی» است، شکل جدی‌تری از سرخکان است که می‌تواند منجر به نقایص مادرزادی در نوزادان شود)

**دو دوز :** در ۱۲-۱۵ ماهگی و ۴-۶ سالگی

## واکسن آبله مرغان (وارسیلا) : طفل شما را از ابتلا به آبله مرغان

محافظت می‌کند.

**دو دوز :** در ۱۲-۱۸ و ۴-۶ سال

## واکسین سینه بغل : در برابر پنوموکوک (که می‌تواند منجر به ذات

الریه، عفونت خون و مننژیت شود)، محافظت می‌کند

**چهار دوز:** در ۲ ماهگی، ۴ ماهگی، ۶ ماهگی و ۱۲-۱۵ ماهگی

## واکسین آنفلانزا (آنفلانزا): از ویروس آنفلانزا محافظت می‌کند

**دو دوز:** برای نوزادان ۶-۱۸ ماه (دوز دوم ۲۸ روز پس از تزریق اول)، سپس تا زمان جوانی هر سال تجویز گردد.

## واکسین کووید ۱۹: واکسن‌های کووید-۱۹ به بدن ما کمک می‌کنند تا

در برابر ویروسی که باعث کووید-۱۹ می‌شود، بدون اینکه ما بیمار

شویم، مصونیت ایجاد کند.

**واکسین مدرنا:** ۶ ماهگی - برای طفل پنج ساله (دو دوز اولیه و دوز تقویت کننده)

**واکسین فایزر:** ۶ ماهگی - برای طفل چهار ساله (سه دوز اولیه) و برای طفل پنج ساله (دو دوز اولیه و دوز تقویت کننده).



IMMUNIZE  
KANSAS  
COALITION

Language: Dari

سوالی دارید؟ با ارائه دهنده‌ی مراقبت‌های  
صحی در مورد واکسین‌های که طفل تان  
نیاز دارد؛ صحبت کنید.