

عام واکسینونو سره خپل د ماشوم ودې ته مرسته وکړئ.

ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو ماشوم په وړاندیز شوي وخت کې ټول واکسینونه ترلاسه کوي؛ دا ستاسو د ماشوم روغتیا لپاره یو خورا مهمه طریقه ده.

واکسینونه د عمر په اوږدو کې

لاندې مهال ویش چې د ماشومانو د امریکایی اکاډمۍ او CDC (د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز) لخوا وړاندیز شوی؛ تعقیب کړئ.

د ۶-۱۸ میاشتو

اکسین (ډیپتیریا، تیتانوس او پرتوسس) #۲، د روتا ویروس واکسین #۲، د پولیو یا فلج واکسین #۲، د هیموفیلیو انفلونزا واکسین #۲، د سینه بغل واکسین #۲، د کوویډ ۱۹ واکسین (او انفلونزا) (کال په کال)



نوی زیرېدلی ماشومان

د بی هیپاتیت واکسین #۱



د یو تر دوو میاشتو

د بی هیپاتیت واکسین #۲



د دوو میاشتو

اکسین (ډیپتیریا، تیتانوس او پرتوسس) #۱، د روتا ویروس واکسین #۲، د پولیو یا فلج واکسین #۱، د هیموفیلیو انفلونزا واکسین #۱، د سینه بغل واکسین #۱



د ۱۲-۱۵ میاشتو

درې گونی واکسین (د شری، ممپس او روبیلا) #۱، د اچ آی بی ډوله انفلونزا واکسین #۴، تور ټوخی واکسین #۴، د چیچک دانو واکسین #۱



د ۴ میاشتو

اکسین (ډیپتیریا، تیتانوس او پرتوسس) #۲، د روتا ویروس واکسین #۲، د پولیو یا فلج واکسین #۲، د هیموفیلیو انفلونزا واکسین #۲، د سینه بغل واکسین #۲



د ۱۵-۱۸ میاشتو

اکسین (ډیپتیریا، تیتانوس او پرتوسس) #۴



د ۴-۶ کلنو

اکسین (ډیپتیریا، تیتانوس او پرتوسس) #۵، د پولیو واکسین #۴، درې گونی واکسین #۲، د چیچک دانو واکسین #۲، او د کوویډ ۱۹ تقویت کوونکی واکسین (په ۵ کلنۍ کې)



د ۶ میاشتو

اکسین (ډیپتیریا، تیتانوس او پرتوسس) #۳، د روتا ویروس واکسین #۳، د پولیو یا فلج واکسین #۳، د هیموفیلیو انفلونزا واکسین #۳، د سینه بغل واکسین #۳



د CDC (د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز) د واکسین مهالویش وگورئ.



هريو واکسين څه کوي

د هپاتيت بى او هپاتيت آ واکسينونه: دا ستاسو ماشوم د هپاتيت بى وېروس او هپاتيت آ وېروس چې د ځگر زيان لامل کيږي، څخه ساتي. **درې دوزه واکسين (هپاتيت بى):** د زېږون په وخت کې، د يو تر دوو مياشتو ماشومانو لپاره (د هپاتيت بى #۱، واکسين ورکولو څخه د يو تر دوو مياشتو وروسته) او د ۶-۱۸ مياشتو ماشومانو لپاره (۴ مياشتې وروسته د هپاتيت بى #۲ واکسين ورکولو څخه) **(هپاتيت آ) دوه دوزه واکسين:** د ۱۲-۲۳ مياشتو عمر لرونکو ماشومانو لپاره (دوه خوراکونه، د ۶ مياشتو په توپير)

د روتاوېروس واکسين: ستاسو ماشوم د شديد اسهال او د په بدن کې د اوبو کموالی څخه ساتي **دوه دوزونه:** په ۲ مياشتو يا ۴ مياشتو کې يا **درې دوزونه:** په ۲ مياشتو، ۴ مياشتو، او ۶ مياشتو کې

د هيب انفلونزا واکسين: دا ستاسو ماشوم د هيموفيلس انفلونزا بى ډول کوم چې د عفونت او دماغ زيان سبب کيږي، څخه ساتي. **څلور دوزونه:** په ۲ مياشتو، ۴ مياشتو، ۶ مياشتو او ۱۲-۱۵ مياشتو کې

د (ډيپټيريا، ټيتانوس او پرتوسس) واکسين: د ډيپټيريا (د زړه پرسوب، د زړه ناکامۍ)، تورې ټوڅۍ (ټوکی ټوڅۍ) او ټيتانوس (د عضلاتو دردناک درد لامل کيږي چې د ژامې د بنديدو لامل کيږي) په وړاندې ساتنه کوي. **پنځه دوزونه:** په ۲ مياشتو، ۴ مياشتو، ۶ مياشتو، ۱۸-۱۵ مياشتو او ۴-۶ کلنۍ کې

د پوليو واکسين: دا ستاسو ماشوم د پوليو څخه کوم چې کولی شي لاسونه او پښې فلج کړي، ساتي. **څلور دوزونه:** په ۲ مياشتو، ۴ مياشتو، ۶ مياشتو او ۱۲-۱۵ مياشتو کې

د (شری، ممپس او روبېلا) واکسين: د شری، ممپس او روبېلا په وړاندې ساتنه کوي (روبيلا "جرمن روبېلا" ده، د روبېلا يو ډير جدي بڼه چې کولی شي په ماشومانو کې د زېږون نیمګړتياوې رامنځته کړي) **دوه دوزونه:** په ۱۲-۱۵ مياشتو او ۴-۶ کلنۍ کې

د چيچک دانو (واورسيلا) واکسين: دا ستاسو ماشوم د چيچک دانو په اخته کيدلو څخه ساتي. **دوه دوزونه:** په ۱۲-۱۸ او ۴-۶ کلنۍ کې

د سينه بغل واکسين: د نيوموکوکس په وړاندې ساتي (کوم چې کولی شي د سينه بغل، د وينې انتاناتو او مننژيت لامل شي). **څلور دوزونه:** په ۲ مياشتو، ۴ مياشتو، ۶ مياشتو او ۱۲-۱۵ مياشتو کې

د انفلونزا واکسين (زکام): د انفلونزا وېروس په وړاندې ساتنه کوي **دوه دوزونه:** د ۶-۱۸ مياشتو ماشومانو لپاره (دوهم دوز د لومړي دوز څخه ۲۸ ورځې وروسته)، بيا هر کال تر ځوانۍ پورې.

د کوويد ۱۹ واکسين: د کوويد - ۱۹ واکسين زموږ د بدن سره د هغه وېروس پروړاندې معافيت رامينځته کولو کې مرسته کوي کوم چې د کوويد - ۱۹ لامل کيږي، پرته لدې چې موږ ناروغ شو. **د مدرنا واکسين:** د پنځه کلن ماشوم لپاره (دوه لومړني او يو تقويتي دوزه) **د فايزر واکسين:** د څلور کلن ماشوم لپاره (۳ لومړني دوزونه) او د پنځه کلن ماشوم لپاره (دوه لومړني او يو تقويتي دوزه).



IMMUNIZE
KANSAS
COALITION

Language: Pashto

کومه پوښتنه لرئ؟ د خپل ډاکټر سره د هغه واکسينونو په اړه چې ستاسو ماشوم ورته اړتيا لري؛ خبرې وکړئ.